

Antibioticum	Voor of bij start klinische patiënt	Gedurende opname	Bij thuisbehandeling		
			Tot 3 maanden na start*	Vanaf 3 maanden na start**	Spiegelbepalingen
Amoxicilline (+/- clavulaanzuur)	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	TDM - Amoxicilline HAGA
Benzylpenicilline	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	TDM - Benzylpenicilline HAGA
Cephalosporines (cefazoline, cefuroxim, ceftriaxon, ceftazidim)	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	
Ciprofloxacin	Standaard	1x/week standaard	2x/maand standaard	1x/1-3 maanden standaard	
Clindamycine	Standaard	1x/week standaard	2x/maand standaard	1x/1-3 maanden standaard	
Cotrimoxazol	Standaard + kalium	1x/week standaard + kalium	2x/maand standaard + kalium	1x/1-3 maanden standaard + kalium	TDM - Cotrimoxazol HAGA
Doxycycline	Standaard	1x/week standaard	2x/maand standaard	1x/1-3 maanden standaard	
Echinocandines (anidulafungine, micafungine,)	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	
Erythromycine	Standaard + uitgangs ECG	1x/week standaard	2x/maand standaard	1x/1-3 maanden standaard	
Flucloxacilline	Standaard + bloedbeeld + kalium	1x/week standaard + bloedbeeld + kalium	2x/maand standaard + bloedbeeld + kalium	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld + kalium	TDM - Flucloxacilline HAGA
Fluconazol	Standaard	1x/week standaard	2x/maand standaard	1x/1-3 maanden standaard	
Levofloxacin	Standaard	1x/week standaard	2x/maand standaard	1x/1-3 maanden standaard	
Linezolid	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	NVT	NVT	
Meropenem	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard	
Metronidazol	Standaard	1x/week standaard	NVT	NVT	
Piperacilline-tazobactam	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	
Rifampicine	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	NVT	
Teicoplanine	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	TDM - Teicoplanine HAGA
Vancomycine	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	TDM - Vancomycine HAGA
Voriconazol	Standaard + bloedbeeld	1x/week standaard + bloedbeeld	1x/week ALAT, AF 2x/maand standaard + bloedbeeld	1x/1-3 maanden standaard + bloedbeeld	TDM - Voriconazol HAGA

Standaard = ALAT, AF, kreatinine + egfr, CRP, leuco's. Bloedbeeld = Hb, Ht, erytrocyten, leucocyten, trombocyten

*Bij orale antibiotica, klinisch ongecompliceerd beloop en behandelduur <2 weken is een lagere frequentie te overwegen.

**Frequentie van controles bij antibioticagebruik langer dan 3 maanden dient per patiënt afgestemd te worden. Over het algemeen kan gesteld worden: gedurende de eerste 6 maanden 1x/maand, tussen de 6 maanden en 1 jaar 1x/ 2 maanden, en vanaf 1 jaar 1x/3 maanden.